

รายการยาที่พบ drug interaction กับ warfarin ได้บ่อย

D = delayed , 1 = major ,2= modurate , 3= minor

พ=เพิ่มฤทธิ์

**D 1 = ginko , macrolide, magnesium salt , metronidazole , quinolone , salicylate ,sulfonamide**

**Tetracyclin ,vit E ,thyroxine**

D 2=Allopurinol , Beta-blocker ,cephalosporin ,para,cimetidine,simvastatin,Barbiturate ,NSAID

Azole antifungal ,omeprazole, furosemide , COX 2 selective , progestin , tramadol , TCA ,NSIAD

D 3=Chloral hydrate

ลดฤทธิ์

**D 1= barbiturate , nevirapine , lopinavir/ritronavir ,thioamine**

D 2=rifampin , HCTZ , VIT K , estrogen

แบบบันทึกการจัดยาผู้ป่วยในชื่อ..... เตียง..... HN.....

วันที่														
ผู้พิมพ์น้ำเงิน														
ผู้บันทึกข้อมูล														
ผู้จัดยา														
ผู้เรียงยาในกล่อง														
ผู้ตรวจสอบ														
ผู้จ่ายยากลับบ้าน														

แพ็คยา หรือมีข้อห้ามใช้.....  เม่เพบ  การจัดการ .....

ปัญหาการใช้ยาในผู้ป่วย เช่น อ่านหนังสือไม่ได้ , ทานยาไม่ถูกต้อง , ใช้ยาชำรุดหักอน หรือ อื่นๆ..... การแก้ไข.....

Medication reconciliation .....  No med

ประวัติไม่เข้าเด่น รวมสัมภาษณ์ เพิ่มเติม.....  ยังไม่นำยามาจาก WORD (ติดตาม).....  นำมาแล้ว วันที่.....

รายละเอียด.....

ญาติจะนำยามาให้ดูวันที่ .....ยาที่นำมา.....

ผู้ป่วยทาน สมุนไพร ยาชาด ยาลูกคลอน ผักใบเขียว อาหารเสริม อื่นๆ.....  ไม่ได้ทาน

ผู้ป่วย ตั้งครรภ์..... トイรามาส.....  ให้นมบุตร..... ผู้ชักประวัติ..... วันที่.....

DRP อื่นๆ ระหว่าง admit

ADR จากยา..... ซักประวัติแล้วโดย.....  ออกบัตร  บันทึกลงคอม แล้ว.....

รายละเอียดอื่นๆ.....

Drug interaction จากยา..... + ..... การแก้ไข..... ผล.....

DUE Antibiotic, Augmentin, ciprofloxacin, Seretide Berodual MDI (ไข้ครั้งแรก), Ceftazidime inj., losartan  
○ ส่งใบประเมินแล้ว ○ ติดตาม.....

ยาเทคนิคพิเศษ ○ insulin..... ○ ยาพ่น..... ○ D/C Consulting..... อื่น.....

HAD..... การติดตาม..... ○ ลง note ใน computer ..เรื่อง..... เกสัชกร.....

รายการยาที่พบ drug interaction กับ warfarin ได้บอ D = delayed , 1 = major , 2= modurate , 3= minor

เพิ่มรถทึช

D 1 = ginkgo , macrolide, magnesium salt , metronidazole , quinolone , salicylate ,sulfonamide ,Tetracyclin ,vit E ,thyroxine ,claritromycin

D 2=Allopurinol , Beta-blocker ,cephalosporin ,para,cimetidine,simvastatin ,NSAID ,Azole antifungal ,omeprazole, furosemide , COX 2 selective , progestin , tramadol , TCA ,NSIAD D 3=Chloral hydrate

ลดฤทธิ์

D 1= phenytoin ,carbamazepine,phenobarbitol , nevirapine , lopinavir/ritonavir ,thioamine , D 2=rifampin , HCTZ , VIT K , estrogen ,griseofluvin

### อาหารวิตามิน K สูง

บีด็อกโคลี สาหร่ายทะเลข ผักกาดหอม โอมากิร์ต และ นม เนย แตงกวา มีเปลี่ยอก  
กะหล่ำปลี ไข่แดง กระหล่ำดอก ตับ หน่อไม้ฝรั่ง น้ำมันปลา ตั้งใจ หอยทากในหมู่ ตะน้ำ  
ผักโขม ผักชีผื่น ผักกาดเขียว พุ噜 มะม่วงดิบ ชาเขียว ผลิตภัณฑ์ถั่วเหลือง

### DI ของยา Theophylline

- เพิ่มการเกิดพิษของยา ได้แก่

Calcium –blockers Cimetidine,Erythromycin  
Oral contraceptives,Quinolones,Levothyroxine

#### ADR

Digoxin

การมองเห็น  
เปลี่ยนแปลง  
กล้ามเนื้ออ่อนแรง

#### ADR

Phenytoin

ตากกระตุก  
เดินเซ  
เหงือกบวม

#### ADR

Theophylline

Tachycardia  
N/V ซัก

CBC date				
Hct 35-45				
Hb 12-16				
MCV 82-98				
RDW < 14.5				
Plt 1.7-3.8				
WBC 4.6-10 พน				
date				
AST 35-40				
ALT 35-40				
date				
BUN				
Cr / CrCl				
date				
Na 135-153				
K 3.5-5.3				
Cl 95-105				
CO <sub>2</sub> 20-30				
AG 8-16				

ยาที่ติดตามค่าขั้นสูตร.....

### DRP เพิ่มเติม