

ยาพ่นที่ใช้ <input type="radio"/> BeradualMDI..... <input type="radio"/> Seretide MDI..... <input type="radio"/> Salbutamol MDI..... <input type="radio"/> Budesonide MDI.....	Plan/ action /result Asthma/ COPD
ปัญหาและการแก้ไข	เทคนิค การเขย่าขวดยาพ่น..... เทคนิคการกดยาพ่น..... ปัญหา..... การติดตาม..... เทคนิคการสูดพ่น.....
หมายเหตุ ใช้ cone spacer แล้ว อายุ.....	ผล.1 / 2 / 3 ปัญหา..... การติดตาม..... หลังพ่นยา steroids = บัวปาก , แปรลักษณ์ , ดื่มน้ำตาม..... ปัญหา..... การติดตาม..... ผล.....
○ ไม่พบเชื้อร้ายในช่องปาก ○ พบรอยรา	
การใช้ยา theophylline ระดับยาที่มีพิษ ตั้งแต่ 15 mg/L ติดตาม toxicity ของยา (tachycardia,N/V,ชา) หักยาตรงรอยปาก หากใช้ยาครึ่งเม็ด DIเพิ่มการกีดพิษของยา Calcium-blocker,cimetidine,erythromycin,Oral contraceptive,quinolone,levothyroxine หมายเหตุ ควรแนะนำการพ่นยา — เทคนิค การเขย่าขวดพ่นยา ไม่ผ่านหัก 10 คะแนน, เทคนิค การพ่นยา ไม่ผ่านหัก 10 คะแนน,หลังพ่นยา steroid ไม่ผ่าน หัก 100 คะแนน	นัยหากการใช้ยาอื่นๆ