แบบติดตามการกินยาต้านไวรัส

FM-PHA-008-00

ชื่อ-นามสกุล.....HN.....

timeline การกินยาต้านไวรัส

- Drug Interaction
  - Ergot(metergin,ergotamine) + PIs(LPV/r)
  - Simvas + PIs → เพิ่มระดับยาทั้งคู่
    + NNRTIs(NVP,EFV) → ↓ ระดับยาทั้งคู่
  - Diazepam + PIs → ↑ ระดับยาทั้งคู่ แนะนำให้ใช้ Lorazepam
- CrCl < 50 → 3TC 150 mg q 24 hr
  TDF 300 mg q 48 hr
- Lactic acidosis → d4T เสี่ยงในหญิงอ้วน → กล้ามเนื้ออ่อนแรงภายในไม่กี่วัน/wk
- กดไขกระดูก → AZT → โลหิตจาง เกิดหลังใช้ยา 2-3 wk แรกจนถึงหลายเดือนแรก
  Htc. ช < 40 ,ญ < 36
  ระวังใช้ AZT ขนาดสูง + Co-trimoxazole

ชื่อยา	วิธีใช้ยา	% Adherence											
		ว/ด/ป.....											
LAB	CD4												
	Viral load												
	AST/ALT												
	Hct												
	LDL/TG												
	Clcr												
ADR													

หมายเหตุ													