

ระบบเฝ้าระวัง High Alert Drug

ชื่อยา	Heparin sodium																																					
รูปแบบและความแรง	1 vial = 5000 units/ml (5 ml)																																					
ขนาดยาที่ใช้																																						
วิธีการให้ยา	<input type="checkbox"/> IV infusion ควรใช้ infusion pump (standard dilution = 25,000 units/500 mL D5W) <input type="checkbox"/> intermittent IV อาจไม่ต้องเจือจาง หรือเจือจางด้วยNSS 50-100 mL <input type="checkbox"/> deep SC จัดเหนือ iliac crest หรือขึ้นไขมันช่วงท้อง หลังจัดยาแล้วให้กดบริเวณที่จัดเบาๆ																																					
ข้อบ่งใช้สำหรับผู้ป่วยรายนี้	<input type="checkbox"/> thromboembolic disorders																																					
การติดตาม	<input type="checkbox"/> pulse <input type="checkbox"/> platelet count, PTT หลังจัด 3.5-4 hr <input type="checkbox"/> Blood pressure <input type="checkbox"/> ระวัง hemoglobin <input type="checkbox"/> สังเกตอาการเลือดออก																																					
	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>รายการ</th> <th>pulse</th> <th>blood pressure</th> <th>platelet count</th> <th>hemoglobin</th> </tr> <tr> <th>เวลา</th> <th>(normal)</th> <th></th> <th>(1.5-4.5 แสนตัว/ml)</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5 นาที</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>30 นาที</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>60 นาที</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>90 นาที</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>120 นาที</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			รายการ	pulse	blood pressure	platelet count	hemoglobin	เวลา	(normal)		(1.5-4.5 แสนตัว/ml)		5 นาที					30 นาที					60 นาที					90 นาที					120 นาที				
รายการ	pulse	blood pressure	platelet count	hemoglobin																																		
เวลา	(normal)		(1.5-4.5 แสนตัว/ml)																																			
5 นาที																																						
30 นาที																																						
60 นาที																																						
90 นาที																																						
120 นาที																																						
วันที่ให้ยา/...../.....เวลา...../...../.....เวลา...../...../.....เวลา.....																																			
ผลข้างเคียงที่พบ	<input type="checkbox"/> ภาวะเลือดออก <input type="checkbox"/> Chest pain, vasospasm <input type="checkbox"/> อื่น ๆ.....	<input type="checkbox"/> ภาวะเลือดออก <input type="checkbox"/> Chest pain, vasospasm <input type="checkbox"/> อื่น ๆ.....	<input type="checkbox"/> ภาวะเลือดออก <input type="checkbox"/> Chest pain, vasospasm <input type="checkbox"/> อื่น ๆ.....																																			
อาการเมื่อได้รับยาเกินขนาด	ภาวะเลือดออก																																					
ยาด้านพิษ	Prolamine ขนาดยาแนะนำ : 1 mg / 1 mg (100 unit) ของ heparin																																					
ความคงตัวของยา	เจือจางแล้วมีความคงตัว 24 hr																																					
ผลลัพธ์ในการใช้ยา	<input type="checkbox"/> ไม่พบผลข้างเคียง และพิษของยา <input type="checkbox"/> ให้ผลตามแผนการรักษา <input type="checkbox"/> พบผลข้างเคียงที่เป็นอันตราย คือ..... <input type="checkbox"/> อื่น ๆ.....	<input type="checkbox"/> ไม่พบผลข้างเคียง และพิษของยา <input type="checkbox"/> ให้ผลตามแผนการรักษา <input type="checkbox"/> พบผลข้างเคียงที่เป็นอันตราย คือ..... <input type="checkbox"/> อื่น ๆ.....	<input type="checkbox"/> ไม่พบผลข้างเคียง และพิษของยา <input type="checkbox"/> ให้ผลตามแผนการรักษา <input type="checkbox"/> พบผลข้างเคียงที่เป็นอันตราย คือ..... <input type="checkbox"/> อื่น ๆ.....																																			
การรายงานแพทย์	<input type="checkbox"/> ไม่รายงาน (ได้ผลตามแผนการรักษา) <input type="checkbox"/> รายงาน เวลา.....น. เนื่องจาก....	<input type="checkbox"/> ไม่รายงาน (ได้ผลตามแผนการรักษา) <input type="checkbox"/> รายงาน เวลา.....น. เนื่องจาก....	<input type="checkbox"/> ไม่รายงาน (ได้ผลตามแผนการรักษา) <input type="checkbox"/> รายงาน เวลา.....น. เนื่องจาก....																																			
ผู้บันทึก																																						